Nishitan Clinic
にしたんクリニック

注射・点滴療法に関する同意書

⚜ 施術により、下記の症状が起こる場合がございます

・注射部位及び周囲の疼痛、発赤、内出血、腫脹、熱感、色素沈着、感染症、神経損傷、血管迷走神経反応、血栓の発生や静脈炎　等

・注射部位およびその周辺に内出血が起こることがあります。これは、血管から血液、薬液が漏れる、針を抜いた後の不十分な止血、針を刺した部位を揉む、その腕で重い荷物を持つなど様々な原因から起こります。一般的に1〜3週間ほどで徐々に吸収され消えますが、出血量、出血部位によってはごくまれに吸収されるまで1ヶ月以上かかる場合があります。内出血に伴い、針を抜いた後でもお痛みが残る可能性がありますが、内出血が治るのと同様に徐々に改善していきます。出血しやすい方（血がサラサラになるお薬を飲まれている方、血が止まりにくい方）はお申し出下さい。

・点滴の所要時間はおよその目安です。血管の状態、血圧により点滴の速度が変化し多少前後する場合がございます。(なお、点滴時間によって効能が変わることはございません)

・迷走神経反射:心理的に緊張・不安が強いと穿刺時に起こりやすいとされ、穿刺前後に起こることもあります。神経が興奮し急激に血圧が下がるため、眩暈、気分不快、意識消失などを引き起こすこともあります。過去に同様の症状が出た経験のある場合は事前にスタッフにお伝え下さい。

・針刺し等、事故による感染予防のため、必要に応じて採血のご協力をお願いする場合がございます。

・体質などにより、アレルギーやアナフィラキシーショックが生じた際は、緊急処置を行います。しかし、専門的な検査・治療を要する際の移送やそこでの検査・治療などに関わる一切の費用に関して当院は責任を負いません。

注射・点滴療法に関する同意書

私は、上記「点滴療法説明書」に基づき担当者より説明を受けました。
料金についても理解し納得いたしましたので下記の内容で点滴療法を受けることに同意いたします。
また、点滴療法中に緊急処置の必要が生じた場合、適切な処置を受けることも承諾・同意いたします。

⚜ 点滴療法の種類

高濃度ビタミンC点滴（G6PD）／マイヤーズカクテル点滴／白玉点滴／スーパー白玉点滴／白玉点滴ビタミンCウルトラ／ダイエット点滴（αリポ酸200mg+L-カルニチン）／スーパー抗酸化点滴／プラセンタ注射／ニンニク注射／ベビーサイトカイン点滴（ヒト乳歯髄幹細胞上清液点滴）／NMN点滴療法／エクソソーム点滴療法

年　　月　　日

患者氏名

＊18歳未満の方は保護者の同意書が必要です。　（18歳未満の方のみ）保護者氏名

お預かりした個人情報は「にしたんクリニック」の全ての医院で共有いたします。予めご了承下さい。

Nishitan Clinic
にしたんクリニック
医療法人社団直悠会 にしたんクリニック

260731_11