Nishitan Clinic
にしたんクリニック

笑気麻酔に関する説明・同意書

⚜ 笑気麻酔の特徴

弱い鎮静、鎮痛剤作用があり、医療用ガスを鼻や口から吸っていただくことで、すぐに効果が表れ施術後は速やかに体から排出されていきます。呼吸器や循環器、肝臓などに影響を与えにくいため、安全に使用出来ます。また、強い痛みは抑えきれないため、笑気麻酔である程度痛みを軽減した状態で、局所麻酔を併用して施術を行うこともあります。

⚜ 以下に当てはまる方は医師の確認が必要です

・中耳炎で治療中の方
・二ヶ月以内に眼科手術を受けられた方
・過呼吸発作の既往がある方
・鼻閉、あるいは呼吸器系疾患のある方
・肺・腸閉塞のある方
・過去に麻酔薬で副作用が出現した方、または身内にそのような方がいらっしゃる方

⚜ 注意点

麻酔効果には個人差があるため、完全な鎮静、鎮痛が得られない場合があります。施術後、めまいやふらつきなどの症状がある方は、数分間から数十分間の酸素吸入と安静を必要とする場合があります。独歩可能と医師が判断した後にご帰宅となります。

治療中は必ず担当医師の指導に従って下さい。医師の指導に従わない場合、十分な治療効果を得られないだけでなく、障害が発生する場合があります。治療の過程で異常を感じた場合は必ず医師や看護師に報告し、必要時は医師の診察を受けその指示に従って下さい。また、合併症が生じた場合の治療費は別途発生いたします。

笑気麻酔に関する同意書

私は、上記の笑気麻酔の作用、副作用および安全性について十分に理解し、
治療を受けることに同意します。

年　　月　　日

患者氏名

＊18歳未満の方は保護者の同意書が必要です。

（18歳未満の方のみ）
保護者氏名

お預かりした個人情報は「にしたんクリニック」の全ての医院で共有いたします。予めご了承下さい。

Nishitan Clinic
にしたんクリニック

医療法人社団直悠会 にしたんクリニック

250716_07