

サリチル酸ピーリングに関する説明書・同意書

❖ サリチル酸ピーリング治療について

サリチル酸(BHA)をマクロゴールという基材に溶かすことによって、酸が皮膚深部へ浸透するのを防ぎ、角質層のみに反応させる事で、肌へのトラブルを少なく、より高いピーリング効果が得られるようになりました。ニキビ肌やニキビ跡、肌のごわつき、毛穴の開き、毛穴詰まりの改善が期待でき、お肌全体のトーンアップ効果もあります。4週間に1回程度のペースでの継続した施術をおすすめいたします。ただし、効果や効果の実感までの期間や回数には個人差があります。

❖ 施術前のご注意

- ・施術中、多少ピリピリ感を感じることがあります。治療後、一時的な肌の赤みや乾燥、ひりつき、かゆみ、水泡形成やむくみ、一時的なニキビの悪化などをきたす可能性があります。肌トラブルが持続するような場合にはご連絡下さい。
- ・妊娠授乳中、アスピリンアレルギーの方は施術を控えて頂いております。日焼け・日焼けする予定がある方、ヘルペス、敏感肌の方、近日中に施術部位の手術を受けた方は施術を受けられない可能性がありますので必ず事前にお申し出下さい。
- ・2、3日前から顔剃り・パック・マッサージはお控え下さい。また剥離作用のあるにきび治療薬、各種ピーリング剤、トレチノイン・レチノール等を使用されている場合も施術前後7日間程度は使用を中止して下さい。

❖ 施術後のケアについて

施術後は日焼け止めクリームを必ず使用して下さい。

ピーリングにより角質が薄くなっていますので、2週間は、紫外線を極力避けて下さい。外出される際には必ず日焼け止めを塗って下さい。

保湿剤によるアフターケア

施術後は皮膚の角質が薄くなっているため、肌の水分が失われやすくなっています。いつもよりこまめに保湿をし、施術部位を強く擦ることは避けて下さい。

施術後のメイクについて

洗顔、お化粧品は直後より可能です。保湿と日焼け対策をしっかり行って下さい。

裏面に続く

治療中は必ず担当医師の指導に従って下さい。医師の指導に従わない場合、十分な治療効果を得られないだけでなく、障害が発生する場合があります。また、治療の過程で異常を感じた場合は必ず医師や看護師に報告し、必要時は医師の診察を受けその指示に従って下さい。また、当院では治療経過の確認のためにカルテ用の写真撮影を行っております。写真撮影の同意がいただけない場合には経過確認が十分にできないため施術効果お問い合わせや施術の影響による合併症(皮膚トラブル・神経症状など)が生じた場合などについて、適切な処置ができない可能性があります。また、合併症が生じた場合の治療費は別途発生いたします。

サリチル酸ピーリング治療に関する同意書

私は、上記のサリチル酸ピーリング治療の作用、副作用および安全性について十分に理解し、サリチル酸ピーリング治療を受けること、写真撮影に同意します。

年 月 日

患者氏名

*20歳未満の方は保護者の(20歳未満の方のみ)
同意書が必要です。 保護者氏名

お預かりした個人情報は「にしたんクリニック」の全ての医院で共有いたします。予めご了承下さい。



Nishitan Clinic
にしたんクリニック

医療法人社団直悠会 にしたんクリニック