

注入治療に関する説明書・同意書

✿ 注入治療について

肌の再生・修復に関わる美容成分やボツリヌストキシンを真皮層へ直接届ける注入治療です。有効成分を直接皮膚に注入することで、保湿やエイジングケアだけではなく、肌そのものの再生能力を促し、小ジワやたるみの改善、ハリ・ツヤの向上、毛穴の縮小、皮脂分泌の抑制、ニキビの改善等が期待できます。

✿ 注入方法

3種類の注入方法からお選びいただけます。※院によって取り扱いメニューが異なります。

- ・MPガン
- ・水光注射
- ・医師による手打ち

✿ 適応症例

目周り・口周りの小じわ、手・首しわの改善、肌の保湿、毛穴の開き、しみ、肌質改善、ニキビ、肌のたるみ

✿ 治療方法と経過

洗顔後、極細の針を用いて、お肌に直接注射することにより有効成分を注入します。

痛みがあるため、麻酔クリームを使用します。(麻酔薬にアレルギーのある方は使用できません。)

痛みが強すぎる場合は冷やしながらの処置も可能ですので、ご相談下さい。

✿ 注意事項

- ・内出血：施術後内出血が出る可能性があります。内出血は3~4週間かけて徐々に吸収され消えていきます。また、目周りに関しましては他の部位より内出血が出る可能性があります。
- ・アレルギー：使用する薬剤にアレルギーを認める場合があります。施術中、施術後お肌に異常な赤み、痒み等認められた場合は必ず受診するようにして下さい。過去に薬剤でアレルギーを起こした経験がある方は事前にお伝え下さい。
- ・感染：注入操作は適切な清潔環境のもと行いますが、まれに感染を起こすことがあります。感染予防のために針を刺した箇所はむやみに手などで触れずに清潔に保って下さい。
- ・施術中は多少の痛みがあります。痛みが強すぎる場合は無理せずお伝え下さい。
- ・極細の針を使用しますが施術後は針刺入部の赤みが出ます。個人差はありますが数日~1週間で徐々に消えていきます。
- ・施術翌日からメイクも可能ですが、1週間程度は刺激の強い化粧品、ピーリング作用のある化粧水などは避けるようにして下さい。また、日焼け止めを使用して下さい。
- ・施術後数日は炎症や浮腫、赤みが強くなる可能性があるため、激しい運動、サウナ、飲酒を避けて下さい。
- ・施術により通常と異なる症状、合併症を認めた場合は、適切な処置を行います。
- ・ケロイド体质、HIV、B型肝炎、C型肝炎、梅毒の感染症、血液をサラサラにする薬を内服されている方、その他重篤な既往症のある方等は施術できません。
- ・針刺し等、事故による感染予防のために必要に応じて採血のご協力を願いする場合がございます。

治疗が受けられない方・注意が必要な方

- | | |
|--------------|----------------|
| ・糖尿病 | ・凝固異常症、抗がん剤投与中 |
| ・妊娠、授乳中の方 | ・B型肝炎 |
| ・HIV | ・リウマチ、膠原病の方 |
| ・炎症性ニキビの方 | ・C型肝炎 |
| ・ヒアルロン酸アレルギー | |

治療中は必ず担当医師の指導に従って下さい。医師の指導に従わない場合、十分な治療効果を得られないだけでなく、障害が発生する場合があります。また、治療の過程で異常を感じた場合は必ず医師や看護師に報告し、必要時は医師の診察を受けその指示に従って下さい。また、当院では治療経過の確認のためにカルテ用の写真撮影を行っております。写真撮影の同意がいただけない場合には経過確認が十分にできないため施術効果に関するお問い合わせや施術の影響による合併症(皮膚トラブル・神経症状など)が生じた場合などについて、適切な処置ができない可能性があります。また、合併症が生じた場合の治療費は別途発生いたします。

注入治療に関する同意書

私は、上記の注入治療の作用、副作用および安全性について十分に理解し、
注入注射治療を受けること、写真撮影に同意します。

年 月 日

患者氏名

*18歳未満の方は保護者の（18歳未満の方のみ）
同意書が必要です。 保護者氏名

お預かりした個人情報は「にしたんクリニック」の全ての医院で共有いたします。予めご了承下さい。

N *Nishitan Clinic* 医療法人社団直悠会 にしたんクリニック

251022_01