

关于点滴/注射的影响

可能会发生内出血、止血困难、药物外渗、输液管回血等情况。

✿ 内出血/止血困难

- 将有可能产生针刺部位出血不止, 或针刺部位及周围区域出现内出血(瘀伤、紫斑、点状出血)等情形。如果您属于容易出血(正在服用血液稀释药物或难以止血)的人士, 请告知我们。
- 如果您有要事, 需露出针刺的手臂或肩膀等部位, 请勿接受治疗。
- 若发生内出血, 次日起可用粉底或遮瑕膏遮盖。


原因

即便是习惯本院治疗的患者, 发生内出血的概率也约为 70% 至 80%。其原因多种多样, 例如血液或药液从血管中渗出、拔针后止血不够充分、揉按针刺部位、用接受扎针的手臂搬运重物等。

内出血(瘀伤)的恢复过程

一般来说1至2周内就会自然愈合。

将由刚形成时呈现的红紫色, 逐渐扩散由蓝色转为黄色, 并逐渐被吸收



✿ 药物外渗

若因输液渗漏至血管外头而感到疼痛。此时请马上告知工作人员。我们将可能为您更换点滴。由于渗入体内的药物会被自然吸收, 通常不会有任何问题, 但若红肿和疼痛的情况接连持续数日, 请务必前来回诊。(可能需要另付挂号费。)

✿ 输液管回血

在施术过程中, 护士可能会藉由检查血液是否通过静脉注射管倒流, 以确保药液没有泄漏。

此外, 血液亦会在输液结束时发生回流。虽无需过于担心, 但若血液回流时间持续过长, 将导致血液变得易于凝固。

如果输液结束后出现血液倒流, 请立即告知工作人员。

如果您有任何疑问, 请随时询问本院工作人员。