

肉毒素注射治疗说明书和同意书

✿ 关于肉毒素

肉毒素为加工肉毒杆菌产生的毒素而製成的注射药物。

能藉由阻断神经作用，软化导致面部细纹的主因的面部肌肉收缩，淡化面部细纹、减低排汗量。

✿ 适用案例

面部细纹、眼角/额头/鼻根处细纹、兔子纹（鼻周的横向及纵向皱纹）、下巴凹凸不平、提升下颌缘、减少腋下出汗

✿ 治疗方法及疗程

为尽量减低肉毒素治疗的痛感，将使用极细针进行注射。倘若您对疼痛较为敏感，可为您以麻醉软膏进行表层麻醉，请事先谘询本院。

局部注射后，将减缓末梢神经向肌肉传递指令，2至3日后肌肉将暂停运动持续约6个月，其时间因人而异。

✿ 注意事项

- 极少情况下会发生皮下出血，通常经1至3周后便会逐便被吸收淡去，但根据出血量及出血部位，亦有极罕见地花上超过一个月的时间恢复的个案。
- 有产生色素沉着的可能。通常花费数月即可逐渐改善，但在极罕见情况中亦可能无法改善。
- 有可能产生副作用，如头痛、过敏反应、局部麻痺、感染、烧灼感，如注射在眉间或前额部位，极少情况下会发生眼睑下垂。（眼睑下垂患者，将可能加重症状）
- 注射后若留下醒目针痕，将在数日内恢复。可正常洗脸或化妆，但一周左右内请勿按摩施术部位。
- 治疗后几天内有加剧炎症、水肿和红肿情况的可能。请避免会加剧代谢的活动，如 剧烈运动、桑拿和饮酒。
- 为防止针刺等事故造成感染，必要时将可能要求您配合采血。
- 有可能因肉毒素作用强烈，导致肌肉不自主运动，产生视觉上不自然或难以变化表情。
- 由于肉毒素主为蛋白质所组成，持续治疗过程，极少情况下会因体内抗体生成，导致效果减弱。
- 迷走神经反射：如内心过于紧张或焦虑，在穿刺时则容易发生，亦有在穿刺前后发生的案例。

迷走神经过度兴奋时血压骤然下降，将可能导致头晕、不适、意识丧失。

如果您过去曾出现过类似症状，请提前告知工作人员。

- 感染：进行注射时，将先为针刺部位消毒后，再进行适切的清洁，但在极少数情况下依然会发生感染。为预防感染，请保持针刺过后部位的清洁。

❖ 无法接受治疗的人士・需要注意的人士

- ・过往有过因肉毒杆菌导致食物中毒的人
- ・治疗部位有痤疮或其他炎症的人
- ・怀孕或哺乳中的人(包括可能怀孕的人)

※怀孕或哺乳中的人士无法接受治疗。可能怀孕的女性在肉毒素治疗过程中, 以及最后一次治疗过后满2个月前请采取避孕措施。男性则需在肉毒素治疗过程中及最后一次治疗过后至少3个月内采取避孕措施。

治疗期间请务必遵守医师的指示。如果不遵照医师的指示, 不仅可能无法获得充分的治疗效果, 还可能留下后遗症。另外, 如果在治疗过程中感到任何异常, 请务必向医生或护士报告, 必要时请咨询医生并遵循医生的指示。此外, 本院将拍摄病历照片以确认治疗进度。如果您不同意拍摄, 我们将无法充分确认您的治疗情况, 以致可能无法针对治疗成效的询问或因治疗产生的并发症(皮肤问题、神经症状等), 提供适当的处置。

如果出现并发症, 需另行支付相关治疗费用。