

二氧化碳点阵激光治疗说明书和同意书

✿ 关于二氧化碳点阵激光

最新的剥脱性点阵激光可针对不同症状选择治疗模式，以治疗痤疮疤痕、皱纹、色素病、修复皮肤（肌肤回春）等。二氧化碳点阵激光采用10,600纳米波长，与皮肤中的水分产生反应，引发蒸腾及热凝固作用。其作用可确保除去部分可被汽化的组织，促进胶原蛋白再生，用于治疗痤疮疤痕、伤疤、毛孔粗大、肤质改善等。

✿ 适用案例

痤疮疤痕（环形凹陷）、毛孔粗大、凹凸不平、皱纹、疤痕、悬垂性纤维肿、黑痣、酒糟鼻

✿ 治疗方法及疗程

将针对病症选择合适的照射模式进行治疗。治疗完毕可能会立即出现发红、肿胀、表皮剥落区域呈现泛白斑点等，皆属正常反应，无须担忧。发红或肿胀会在治疗后3天至2周内逐渐自然恢复。另外，照射后虽可能会在当下感到些许刺痛，也属于暂时性现象，将随着时间推移而淡去。上述症状的显现因人而异，亦可能需要耗费较长时间恢复。

✿ 注意事项

- 由于施术后的肌肤极为敏感，请避免使用容易导致湿疹、发痒或皮肤过敏等刺激性较强的护肤品。
- 可通过冰敷缓解治疗部位的肿胀或发红等症状，如若情况未得改善，或者您有相关疑虑，请联系本院。
- 照射当天起1至2日内，请使用凡士林等润肤霜防止肌肤干燥。
- 为防止感染请保持皮肤清洁，持续红肿的期间请用温水或冷水轻柔洗净，勿使用磨砂膏或带去角质功能的洗面奶。
- 如无併发症状，3至5日后起便可化妆。剃鬚须在痂皮脱落后才可进行。
- 治疗当天请避免剧烈运动、桑拿和饮酒。
- 治疗期间，为防止引起併发症，请使用防晒系数SPF30以上的防晒霜避免晒伤。
- 治疗后的变化将多少存在个人差异。
- 治疗途中和治疗后将有可能产生预期外的併发症或后遗症。
- 接受治疗的当天起至数日内，治疗部位将可能出现发红或肿胀，需请您进行数天的自我护理。此外，治疗结束前请使用防晒霜，以降低色素沉着的风险。

✿ 併发症

- 在极少数情况下，治疗部位可能出现烧伤，并伴随皮下出血、紫癜、水泡（皮下积水）等症状
- 有产生色素沉着的可能。通常花费数月即可逐渐改善，但在极罕见情况中亦可能无法改善。
- 在极罕见情况下，可能会引起湿疹和发痒。
- 有可能会加重黄褐斑。

❖ 无法接受治疗的人士・需要注意的人士

※患有下述疾病或病症及使用下述药物的人士无法接受治疗※

- ・正在服用阿库坦（异维A酸）的人
- ・怀孕或哺乳中的人
- ・治疗部位有感染的人
- ・有黄褐斑的人
- ・治疗部位有 I 型或 II 型活动性单纯疱疹病变的人
- ・有光敏感性的人
- ・有免疫缺陷或使用免疫抑制剂的人
- ・正在服用稀释血液的药物的人
- ・抗凝异常的人
- ・治疗部位有皮肤肿瘤的人
- ・有瘢痕体质的人
- ・治疗部位有血管疾病、刺青、纹绣的人
- ・刚晒伤的人

治疗期间请务必遵守医师的指示。如果不遵照医师的指示, 不仅可能无法获得充分的治疗效果, 还可能留下后遗症。

另外, 如果在治疗过程中感到任何异常, 请务必向医生或护士报告, 必要时请咨询医生并遵循医生的指示。此外, 本院将拍摄病历照片以确认治疗进度。如果您不同意拍摄, 我们将无法充分确认您的治疗情况, 以致可能无法针对治疗成效的询问或因治疗产生的并发症(皮肤问题、神经症状等), 提供适当的处置。

如果出现并发症状, 需另行支付相关治疗费用。