

黑眼圈治疗注射说明书和同意书

✿ 关于黑眼圈治疗注射

这是一款以新一代抗衰老护理注射液（SUNEKOS注射液）针对黑眼圈问题进行全方位改善的疗法。
通过将非交联低分子量透明质酸与六种氨基酸注入真皮层，可望改善眼下黑眼圈。

✿ 适用案例

黑眼圈

✿ 治疗方法及疗程

洗脸后，使用注射器将活性成分直接注入真皮层进行治疗。

✿ 注意事项和副作用

过敏：注射所使用的SNECOS注射液，主要成分为非交联透明质酸和六种氨基酸所组成，由于是原先就存在于体内的物质，引发过敏的危险率慎微，然而可能性并非为零。

若过去曾因透明质酸或氨基酸发生过敏，请提前告知并与医师商量。

感染：进行注射时，将先为针刺部位消毒后，再进行适切的清洁，但在极少数情况下依然会发生感染。为预防感染，请保持针刺过后部位的清洁。

- 治疗过程中将伴随一定的疼痛感。如果疼痛太剧烈，请马上告知医生。
- 在极少数情况下会发生皮下出血，通常经1至3周左右就会被吸收消失，但据出血量与出血部位的不同，极低概率下亦可能需花费一个月以上的时间直至完全被吸收。
- 有产生色素沉着的可能。通常花费数月即可逐渐改善，但在极罕见情况中亦可能无法改善。
- 治疗后隔天起即可化妆，但在一周左右内请避免使用刺激性化妆品或具有去角质功效的乳液，并请使用防晒霜。
- 治疗后几天内请避免剧烈运动、桑拿和饮酒，避免炎症、水肿和红肿情况加剧的可能。
- 如因治疗而出现异常症状或并发症，将为您采取适当的措施。
- 为防止针刺等事故造成感染，必要时将可能要求您配合采血。

✿ 无法接受治疗的人士・需要注意的人士

- 患有皮肤病、皮肤炎症、传染病（HIV、乙型肝炎、丙型肝炎等）或皮肤极度敏感的人
- 曾对 SUNEKOS过敏的人
- 怀孕或哺乳中的人
- 正在服用华法林、阿司匹林等药物的人
- 接受过硅胶整形手术的人

治疗期间请务必遵守医师的指示。如果不遵照医师的指示, 不仅可能无法获得充分的治疗效果, 还可能留下后遗症。另外, 如果在治疗过程中感到任何异常, 请务必向医生或护士报告, 必要时请咨询医生并遵循医生的指示。此外, 本院将拍摄病历照片以确认治疗进度。如果您不同意拍摄, 我们将无法充分确认您的治疗情况, 以致可能无法针对治疗成效的询问或因治疗产生的并发症(皮肤问题、神经症状等), 提供适当的处置。

如果出现并发症状, 需另行支付相关治疗费用。