

脂肪溶解注射“BNLS”治疗说明书和同意书

✿ 关于BNLS

将由植物萃取物为主制成的传统BNLS药物结合新成分“脱氧胆酸钠”而成的脂肪溶解注射。

*脱氧胆酸钠是一种近年被美国FDA认可的医学成分，具有溶脂作用。作用于破坏脂肪细胞膜，去除中性脂肪，从而破坏脂肪细胞。

✿ 预期效果

以脂肪分解、紧致肌肤、淋巴循环等三大功效改善血液及淋巴流动，促进溶解后的脂肪与体内累积废物的排放。

✿ 注射部位

可用于额头、鼻子、鼻孔、颧骨、脸颊（法令纹周围）、下脸颊、侧脸颊、下颚（下巴后方）、上臂、大腿、腹部、背部。

✿ 注意事项

・关于肿胀

注射后，您可能会感到轻微疼痛、肿胀或瘀伤（内出血）。肿胀会在约2至3天内消退，内出血会在约3至4週内逐渐被吸收消失。此外，在极少数情况下虽可能发生色素沉着，但在数个月间将逐渐改善。为防止感染，请保持注射部位清洁。

・效果因人而异，建议进行平均3~4次治疗。

・由于治疗后数日内发炎、肿胀、发红等症状可能加重，请避免剧烈运动、桑拿及饮酒。

・如果维持发红或肿胀症状，请尽快至本院回诊。

・迷走神经反射：如内心过于紧张或焦虑，在穿刺时则容易发生，亦有在穿刺前后发生的案例。

迷走神经过度兴奋时血压骤然下降，将可能导致头晕、不适、意识丧失。

如果您过去曾出现过类似症状，请提前告知工作人员。

感染：进行注射时，将先为针刺部位消毒后，再进行适切的清洁，但在极少数情况下依然会发生感染。为预防感染，请保持针刺过后部位的清洁。

・为防止针刺等事故造成感染，必要时将可能要求您配合采血。

✿ 无法接受治疗的人士・需要注意的人士

・怀孕或哺乳中的人（包括可能怀孕的人）

・患有小血管病或供血不足的人

・患有免疫缺陷或自体免疫疾病的人

・正在服用稀释血液的药物的人

・正在接受抗癌药物治疗的人

・治疗部位皮肤患有溃疡、湿疹或牛皮癣、感染的人

治疗期间请务必遵守医师的指示。如果不遵照医师的指示, 不仅可能无法获得充分的治疗效果, 还可能留下后遗症。

另外, 如果在治疗过程中感到任何异常, 请务必向医生或护士报告, 必要时请咨询医生并遵循医生的指示。此外, 本院将拍摄病历照片以确认治疗进度。如果您不同意拍摄, 我们将无法充分确认您的治疗情况, 以致可能无法针对治疗成效的询问或因治疗产生的并发症(皮肤问题、神经症状等), 提供适当的处置。

如果出现并发症状, 需另行支付相关治疗费用。