

透明质酸（玻尿酸）注射治疗说明书和同意书

✿ 关于透明质酸（玻尿酸）注射

透明质酸为存在人体皮肤、关节或细胞间隙中的物质。能维持胶原组织，有助保持皮肤组织的水分、湿润及柔软性。用于注射的透明质酸制剂呈透明凝胶状。注射至皮肤后将与存在人体自身的透明质酸融合，使肌肤变得饱满并去除皱纹。

✿ 适用案例

眼角细纹、眼下凹陷、法令纹、改善木偶纹、随年龄产生的上眼皮、太阳穴、充填脸颊凹陷、隆鼻、下巴尖塑型、丰唇

✿ 治疗方法及疗程

使用针头将透明质酸注射至治疗部位。可使用麻醉软膏减轻疼痛，或使用钝针套管减少皮下出血机率。

效果持续时间因人而异，一般约为6个月至2年。（视制剂而定）

必要时，可根据个人肤况、年龄及喜好进行额外注射。

本院提供多种高品质的透明质酸，可依据部位、问题和症状推荐最适合您的制剂。

✿ 注意事项及副作用

- 过敏：由于用于注射的透明质酸并非从提取自动物，由透明质酸本身引起感染或过敏的危险性极小，但可能性并非为零。如果注射部位出现发红或肿胀，请勿自行判断，尽速回诊。
- 疼痛：注射透明质酸将伴随轻微痛感。如果您对疼痛敏感，请提前咨询医生。有可能在注射部位感到几天到几周的钝痛感。如果疼痛持续且日渐加剧，请尽速回诊。
- 肿胀：术后极少数的情况下会出现肿胀。即使发生，也会在2至3天内消退。
- 极少情况下会发生皮下出血，通常经3至4周后便会逐便被吸收淡去，可用化妆品遮盖。为防皮下出血，请在术后几天内避免饮酒、长时间泡澡、桑拿和剧烈运动。
- 极少情况下有产生色素沉着的可能。通常花费数月即可逐渐改善。
- 迷走神经反射：如内心过于紧张或焦虑，在穿刺时则容易发生，亦有在穿刺前后发生的案例。迷走神经过度兴奋时血压骤然下降，将可能导致头晕、不适、意识丧失。如果您过去曾出现过类似症状，请提前告知工作人员。
- 血液循环受阻：透明质酸制剂可能会压迫或阻塞血管，导致皮肤和周围组织血液循环不畅。
- 肿块：大部分透明质酸会被吸收，但亦可能有部分长时间未能被吸收而形成肿块。
- 感染：进行注射时，将先为针刺部位消毒后，再进行适切的清洁，但在极少数情况下依然会发生感染。为预防感染，请保持针刺过后部位的清洁。
- 为防止针刺等事故造成感染，必要时将可能要求您配合采血。

❖ 无法接受治疗的人士・需向医师咨询的人士

- ・对甲哌卡因或麻醉过敏的人
- ・治疗部位有痤疮或其他炎症的人
- ・曾对透明质酸过敏的人
- ・怀孕中的人
- ・曾在治疗部位进行埋线拉提或其他手术的人

治疗期间请务必遵守医师的指示。如果不遵照医师的指示, 不仅可能无法获得充分的治疗效果, 还可能留下后遗症。

另外, 如果在治疗过程中感到任何异常, 请务必向医生或护士报告, 必要时请咨询医生并遵循医生的指示。此外, 本院将拍摄病历照片以确认治疗进度。如果您不同意拍摄, 我们将无法充分确认您的治疗情况, 以致可能无法针对治疗成效的询问或因治疗产生的并发症(皮肤问题、神经症状等), 提供适当的处置。

如果出现并发症状, 需另行支付相关治疗费用。