

## Metslim(二甲双胍)同意书

### ❖ 功效

除了抑制肝脏合成输出糖质外,该药物还透过改善胰岛素敏感性促进肌肉和脂肪组织中的葡萄糖摄取、减少肠道葡萄糖吸收等多种作用改善血糖水平。

### ❖ 主要副作用

主要副作用包括腹泻、食欲不振、腹痛、恶心、呕吐、腹胀、便秘、消化不良、皮疹、发痒、倦怠感和肌肉疼痛等。儘管发生频率未知,但曾出现乳酸性酸中毒、低血糖、肝功能障碍、黄疸和横纹肌溶解症等病例通报。如果您发现上述症状,请咨询您的医生。

### ❖ 用法・用量

- 每日两次,每次1粒,于午餐及晚餐后服用。
- 如果忘记服药,请勿立即补服,依照随餐服用原则下次再服用正常剂量即可。
- 切勿同时服用两次剂量。
- 高处作业或开车时,请注意低血糖症状。

### ❖ 成分

每片含《日本药典》规定的盐酸二甲双胍500mg。

此外,作为添加剂,亦含有羟丙基纤维素、交聚维酮、轻质硅酸酐、硬脂酸镁、羟丙基纤维素、滑石粉、氧化钛和黄色三氧化二铁。

### ❖ 无法接受治疗的人士・需要注意的人士 \*患有以下疾病或症状的人无法接受治疗。

- 有乳酸性酸中毒病史的人(胃肠道症状、疲劳、肌肉疼痛、换气过度等)
- 严重肾功能障碍、肝功能障碍、透析患者(包括腹膜透析)
- 如果您的心血管系统或肺功能严重受损(休克、心脏衰竭、心肌梗塞、肺栓塞等)并且容易出现低氧血症
- 有脱水症状(腹泻、呕吐等肠胃疾病、进食困难等)
- 过度酒精摄取
- 严重酮症、糖尿病昏迷或昏迷前期、第一型糖尿病患者
- 感染严重、手术前后或有严重外伤
- 营养不良、饥饿、虚弱、脑下垂体功能不全、肾上腺功能不全
- 孕妇或可能怀孕的女性
- 有对该药物成分或双胍类药物过敏史

### ❖ 併用禁止事项 \*以下情况不能使用。

- 酒精(过量摄取)

❖ 併用注意事项 \*如果您正在使用以下药物, 请谨慎服用。

- 碘造影剂
- 高肾毒性抗生素<庆大霉素等>
- 具有利尿作用的药物<利尿剂、SGLT2抑制剂等>
- 增强降血糖作用的药物  
<糖尿病药物(胰岛素制剂、磺酰脲类、速效胰岛素促分泌剂、 $\alpha$ -葡萄糖苷酶抑制剂、噻唑烷类药物、DPP-4抑制剂、GLP-1受体激动剂、SGLT2抑制剂)、蛋白质合成代谢剂、荷尔蒙、水杨酸盐(阿斯匹灵等)、 $\beta$ 受体阻断剂(普萘洛尔等)、单胺氧化酶抑制剂>
- 减低降血糖作用的药物  
<肾上腺素、肾上腺皮质激素、甲状腺激素、卵泡激素、利尿剂、吡嗪酰胺、异烟肼、菸硷酸、吩噻嗪类药物>
- 西咪替丁、多替拉韦、比克替拉韦、凡德他尼

❖ 服用时的注意事项 \*如果患有以下疾病或症状, 请注意服用本药。

- 进餐不规则或用餐不足(可能导致低血糖)
- 剧烈的肌肉运动(可能导致低血糖)
- 轻度至中度肾功能障碍(可能导致乳酸性酸中毒)
- 轻度至中度肝功能障碍(可能导致乳酸性酸中毒)
- 感染(可能导致乳酸性酸中毒)
- 老年人(经验上75岁以上的老年人一天使用剂量超过1,500毫克的案例有限)