

皮秒激光治疗说明书和同意书

✿ 关于皮秒激光

皮秒激光为一种能在极短时间—皮秒(1皮秒=一万亿分之1秒)内照射激光的机器。由于照射时间短,最大功率输出高,可瞬间将能量传递至色斑等黑色素,因其热效应小,有望在较少的疗程次数内改善肤色。以外,亦可抑止激光照射后的副作用(发炎反应或色素沉着)。

✿ 适用案例

- 改善斑点、雀斑、唇部色素斑、肤质、真皮黑素细胞增多症(ADM)
- 改善凹凸不平的痤疮疤痕、皮肤细小皱纹
- 早期脂溢性角化病(疣)、去除纹绣、去除刺青

✿ 治疗前的注意事项

- 如您处于晒伤状态,发生灼伤的机率将大幅增加,故无法为您进行照射。
- 为防晒伤,请使用防晒系数SPF30以上的防晒霜。

※如您已晒伤,将待症状舒缓后才进行照射。

- 治疗部位若残留防晒霜或化妆品(含乳液及化妆水),其成分与激光反应可能引起灼伤。在照射前请务必卸下。
- 如您有使用助晒油,请在治疗1至2周前停止使用。

✿ 治疗后的注意事项

- 在照射激光嫩肤或点状激光后,照射部位有可能留下肿胀或发红的情形,一时性的症状将在一周左右复原。若超过一周以上仍未恢复,请尽早联系本院。
- 将可能产生色素沉淀,通常经过数月便能逐渐改善,但在极少数情况下亦可能无法改善。
- 毛细血管经激光造成损伤,将可能造成暂时性皮下出血。通常在数日至一周内会逐渐消失,但在极少数情况下将留下内出血的痕迹。
- 刚经照射后疼痛强烈的场合,将以冰袋进行冰敷。
- 若是进行点状照射,必要时将以绷带保护,并涂抹外用药物。
- 切勿抓挠治疗部位,刺激皮肤将可能引发色素沉淀。
- 施术当天切勿泡澡,请只用淋浴的方式。并勿饮酒、桑拿及进行剧烈运动。
- 发红、肿胀、发痒的症状过强时请回诊。
- 治疗期间请避免晒伤,做好日常防晒对策。
- 照射后,请遵照医生指示进行居家保养。

✿ 治疗方法及疗程

- 必要时将进行表面麻醉, 如您对疼痛较为敏感, 请咨询医生。
- 将为您配戴护目镜, 保护双眼不受激光伤害。照射途中请勿摘下。
- 即使闭上双眼亦可能会感到晕眩, 但对眼睛并无影响。

✿ 副作用

色素沉着: 易受磨擦和晒伤的部位发生色素沉着的风险会增加

色素脱失: 可能由于热损伤或频繁的治疗导致肤色加深

疤痕: 产生发痕的风险会随原始体质或输出功率及照射间隔时间的缩短而增加

其他并发症: 结痂、水泡、紫癜、红斑、水肿、发痒、炎症等

✿ 无法进行治疗的部位

- 感染性皮肤病或切口、开放性伤口、炎症或化脓
- 直接复盖恶性肿瘤
- 复盖活动性单纯疱疹 1 型和 2 型病变
- 一个月内严重晒伤部位

✿ 无法接受治疗的人士·需要注意的人士

※患有下述疾病或病症及使用下述药物的人士无法接受治疗

- 对波长范围为 532nm、730nm 和 1064nm 的光过敏或对光敏感的人
- 有瘢痕疙瘩或疤痕体质的人
- 患有糖尿病等内分泌疾病的人以及伤口愈合能力受损的人
- 患有出血性疾病或正在服用稀释血液的药物的人
- 怀孕或可能怀孕的人
- 患有或曾经患有与光敏性发作或光敏性相关疾病的人
- 正在使用会引起光敏性的药物、外用药物或营养补充剂者的人

※尚未确定对正在怀孕或哺乳中的人是否安全。请咨询医生。

治疗期间请务必遵守医师的指示。如果不遵照医师的指示, 不仅可能无法获得充分的治疗效果, 还可能留下后遗症。

另外, 如果在治疗过程中感到任何异常, 请务必向医生或护士报告, 必要时请咨询医生并遵循医生的指示。此外, 本院将拍摄病历照片以确认治疗进度。如果您不同意拍摄, 我们将无法充分确认您的治疗情况, 以致可能无法针对治疗成效的询问或因治疗产生的并发症(皮肤问题、神经症状等), 提供适当的处置。

如果出现并发症状, 需另行支付相关治疗费用。